レジメン名称再発/難治性DLBCL ①3日間Pola+R-Benda

インターバル日数： 21　　基準日： 1　　最大クール数：

使用する抗がん剤:

抗癌剤/用法	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 21										
リツキシマブBS点滴静注「ﾌｧｲｻﾞｰ」 療法名:再発/難治性DLBCL ①3日間 Pola+R-Benda 点滴静注(末梢): ＊点滴速度 25ml/h ： 点滴時間 170時間で 投与経路:末梢ルートメイン１ 投与開始2時間後からは 50ml/hrで	375ｍｇ/m2	○													
トレアキシン点滴静注液 療法名:再発/難治性DLBCL ①3日間 Pola+R-Benda 点滴静注(末梢): 点滴速度 610ml/h ： ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン１ 生食250mlと同時に投与	90ｍｇ/m2		○	○											
ポライビー点滴静注用 療法名:再発/難治性DLBCL ①3日間 Pola+R-Benda 点滴静注(末梢): 点滴速度 80ml/h ： ＊点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン１	1.8ｍｇ/kg		○												
休薬完了					休										