レジメン名称【特】胃癌 mFOLFOX6

インターバル日数： 14　　**基準日：** 1　　**最大クール数：**

使用する抗がん剤:

抗癌剤/用法	用量/単位	Day 1	Day 14												
レボホリナート点滴静注用「ﾄｰﾜ」 療法名:【特】胃癌 mFOLFOX6 中心静脈注射(CVﾎﾟｰﾄ): 点滴速度 125ml/h ： ＊点滴時間 2時間で 投与経路:埋込型ｶﾃｰﾃﾙﾙｰﾄ オキサリプラチンと同時投与	200ｍｇ/m2	○													
オキサリプラチン点滴静注「ﾄｰﾜ」 療法名:【特】胃癌 mFOLFOX6 中心静脈注射(CVﾎﾟｰﾄ): 点滴速度 550ml/h ： ＊点滴時間 2時間で 投与経路: 側管 レボホリナートと同時投与	85ｍｇ/m2	○													
フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」 療法名:【特】胃癌 mFOLFOX6 中心静脈注射(CVﾎﾟｰﾄ): 点滴速度 0ml/h ： ＊点滴時間 5分で 投与経路:埋込型ｶﾃｰﾃﾙﾙｰﾄ 全開で滴下	400ｍｇ/m2	○													
フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」 療法名:【特】胃癌 mFOLFOX6 インフューザー(2.5mL/hr): 点滴速度 1043ml/h ： ＊点滴時間 46時間で 投与経路:埋込型ｶﾃｰﾃﾙﾙｰﾄ 注入時間46時間 全量100ml	2400ｍｇ/m2	○													
休薬完了			休												