# レジメン名称乳癌 Pembro+weeklyｱﾌﾞﾗｷｻﾝ(TN,PD-L1(+))

**インターバル日数：** 7　　**基準日：** 1　　**最大クール数：**

**使用する抗がん剤:**

| 抗癌剤/用法 | 用量/単位 | Day 1 | Day 7 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キイトルーダ点滴静注<br>療法名:乳癌<br>Pembro+weeklyｱﾌﾞﾗｷｻﾝ(TN,PD-L1(+))<br>点滴静注(末梢):<br>点滴速度 200ml/h ： ＊点滴時間 30分で<br>投与経路:末梢ルートメイン１ | 200ｍｇ | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| アブラキサン点滴静注用<br>療法名:乳癌<br>Pembro+weeklyｱﾌﾞﾗｷｻﾝ(TN,PD-L1(+))<br>点滴静注(末梢):<br>点滴速度 200ml/h ： ＊点滴時間 30分で<br>投与経路:末梢ルートメイン１ | 100ｍｇ/m2 | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 休薬完了 | | | 休 | | | | | | | | | | | | |