

術前中止薬一覧

種類	一般名	商品名	茨城県立中央病院手術部推奨中止期間案		
糖尿病薬	インスリン 分泌促進薬	ミチグリニド	グルファスト	当日から休薬	
		レパグリニド	シュアポスト		
		ナテグリニド	スターシス ファスティック		
	SU剤	グリメピリド	アマリール		当日から休薬
		グリベンクラミド	オイグルコン ダオニール		
		グリクラジド	グリミクロン		
		グリクロピラミド	デアメリン		
		アセトヘキサミド	ジメリン		
		クロルプロパミド	クロルプロパミド		
	α-GI	アカルボース	グルコバイ		当日から休薬
		ミグリトール	セイブル		
		ボグリボース	ベイスン		
	TZD誘導体	ピオグリタゾン	アクトス	当日から休薬	
	BG類	メトホルミン	メトグルコ	前々日から休薬	
			グリコラン		
		ブホルミン	ジベトス		
			ジベトン		
	DPP-4 阻害薬	ビルダグリプチン	エクア	当日から休薬	
		シタグリプチン	ジャヌビア グラクティブ		
			テネリグリプチン		テネリア
		リナグリプチン	トラゼンタ		
		アログリプチン	ネシーナ		
		サキサグリプチン	オングリザ		
		アナグリプチン	スイニー		
		トレラグリプチン	ザファテック(週1回製剤)		
		オマリグリプチン	マリゼブ(週1回製剤)		
	SGLT-2 阻害薬	カナグリフロジン	カナグル	3日前から休薬	
エンパグリフロジン		ジャディアンス			
イプラグリフロジン		スーグラ			
ダパグリフロジン		フォシーガ			
トホグリフロジン		デベルザ アプルウェイ			
		ルセオグリフロジン	ルセフィ		
GLP-1(注射)	デュラグルチド	トルリシティ(週1回製剤)	当日から休薬		
	エキセナチド	バイエッタ ビデュリオン(週1回製剤)			
		リラグルチド		ビクトーザ	
	インスリンデグルデク/リラグルチド	ゾルトファイ			
	リキシセナチド	リクスミア			
	インスリンラルギン/リキシセナチド	ソリクア			
	セマグルチド	オゼンピック(週1回製剤)			
GLP-1(経口)	セマグルチド	リベルサス	当日から休薬		
BG + TZD	メトホルミン/ピオグリタゾン	メタクト	前々日から休薬		
BG + DPP-4	メトホルミン/ビルダグリプチン	エクメット			
	メトホルミン/アログリプチン	イニシンク			
	メトホルミン/アナグリプチン	メアナ			
SU + TZD	グリメピリド/ピオグリタゾン	ソニアス	当日から休薬		
DPP-4 + TZD	アログリプチン/ピオグリタゾン	リオベル			
α-GI + インスリン分泌促進薬	ボグリボース/ミチグリニド	グルベス			
DPP-4 + SGLT-2	テネリグリプチン/カナグリフロジン	カナリア	3日前から休薬		
	シタグリプチン/イプラグリフロジン	スージャヌ			
	リナグリプチン/エンパグリフロジン	トラディアンス			