

術前中止薬一覧

種類	一般名	商品名	茨城県立中央病院手術部推奨中止期間案	
抗血栓薬	抗凝固薬	アピキサバン	エリキュース 出血低リスク Ccr 30以上 24時間以上前から休薬 15-30 36時間以上前から休薬 出血高リスク Ccr 15以上 48時間以上前から休薬	
		リバーロキサバン	イグザレルト 24時間以上前から休薬	
		ダビガトランエテキシラート	プラザキサ 出血低リスク Ccr 80以上 24時間以上前から休薬 50-79 36時間以上前から休薬 30-49 48時間以上前から休薬 出血高リスク Ccr 80以上 48時間以上前から休薬 50-79 72時間以上前から休薬 30-49 96時間以上前から休薬	
		エドキサバン	リクシアナ 24時間以上前から休薬	
		ワルファリン	ワーファリン 3~5日前から休薬 ただしINRの確認必要	
	抗血小板薬	サルポグレラート	アンプラーグ 24時間以上前から休薬	
		ジピリダモール	ペルサンチン	1~2日前から休薬 リスクに応じて判断
			ヨウリダモール	
		イコサペント酸エチル(EPA)	エパデール	7~10日前から休薬 リスクに応じて判断
			エパラ	
			エパロース	
		プラスグレル	エフィエント 血小板凝集抑制が問題となるような手術の場合には、14日以上前に投与を中止する	
		リマプロストアルファデクス	オパルモン	1日前から休薬 リスクに応じて判断
			プロレナール	
		ジラゼプ	コメリアンコーワ 2~3日前から休薬 リスクに応じて判断	
		シロスタゾール	プレタール	3日前から休薬
			コートリズム	
			シロシナミン	
			シロスレット	
			プレトモール	
ホルダゾール				
アスピリン	バイアスピリン	7日前から休薬		
アスピリン/ダイアルミネート	アスファネート			
	パファリン			
	ファモター			
	ニトギス			
バッサミン				
アスピリン/ランソプラゾール	タケルダ	14日前から休薬		
アスピリン/ボノプラザン	キャブピリン			
アスピリン/クロピドグレル	コンプラビン ロレアス			
イフェンプロジル	セロクラール 1~2日前から休薬 リスクに応じて判断			
チクロピジン	パナルジン	10~14日前から休薬		
	マイトジン			
ベラプロストナトリウム	プロサイリン	1日前から休薬 リスクに応じて判断		
	ケアロードLA			
	ドルナー			
	ベラサスLA			
クロピドグレル	プラビックス 14日以上前に中止が望ましい			
オメガ-3脂肪酸エチル・イコサペント酸エチル・ドコサヘキサエン酸エチル	ロトリガ 7~10日前から休薬			
チカグレロル	ブリリント 5日以上前から休薬			
トラピジル	ロコルナール 2~3日前から休薬 リスクに応じて判断			