

レジメン名称多発性骨髄腫 ①ELd

インターバル日数： 28

基準日： 1

最大クール数：

使用する抗がん剤：

抗がん剤/用法	用量/単位	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22	Day 28									
エムブリシチー静注用 療法名：多発性骨髄腫 ①ELd 点滴静注(末梢)： *点滴速度 30ml/h：点滴時間 700分で 投与経路：末梢ルートメイン1 エムブリシチーはレナリドミド内服終了後 3～24時間以内に投与すること	10m g/kg	○													
エムブリシチー静注用 療法名：多発性骨髄腫 ①ELd 点滴静注(末梢)： *点滴速度 180ml/h：点滴時間 1.94時間 で 投与経路：末梢ルートメイン1 エムブリシチーはレナリドミド内服終了後 3～24時間以内に投与すること	10m g/kg		○												
エムブリシチー静注用 療法名：多発性骨髄腫 ①ELd 点滴静注(末梢)： *点滴速度 300ml/h：点滴時間 1.17時間 で 投与経路：末梢ルートメイン1 エムブリシチーはレナリドミド内服終了後 3～24時間以内に投与すること	10m g/kg			○	○										
休薬完了						休									

レナリドミド 25 mg/body Day1-21
 デキサメタゾン 28 mg/body Day1, 8, 15, 22