

レジメン名称再発/難治性多発性骨髄腫 ①DBd

インターバル日数： 21

基準日： 1

最大クール数：

使用する抗がん剤：

抗癌剤/用法	用量/単位	Day 1	Day 4	Day 8	Day 11	Day 15	Day 21								
ベルケイド下注射用 療法名：再発/難治性多発性骨髄腫 ①DBd 皮下注射：ワンショット 左右大腿部・腹部に投与 1mLシリンジで払い出し	1.3m g /m2	○	○	○	○										
ダラザレックス点滴静注 療法名：再発/難治性多発性骨髄腫 ①DBd 点滴静注(末梢)： *点滴速度 50ml/h：点滴時間 1200分で 投与経路：末梢ルートメイン1	16m g /kg	○													
ダラザレックス点滴静注 療法名：再発/難治性多発性骨髄腫 ①DBd 点滴静注(末梢)： *点滴速度 50ml/h：点滴時間 10時間で 投与経路：末梢ルートメイン1	16m g /kg			○											
ダラザレックス点滴静注 療法名：再発/難治性多発性骨髄腫 ①DBd 点滴静注(末梢)： *点滴速度 100ml/h：点滴時間 5.01時間 で 投与経路：末梢ルートメイン1	16m g /kg					○									
休業完了							休								

デキサメタゾン 20 mg/body Day2, 4, 5, 9, 11, 12 (75歳<省略可)