

レジメン名称初発多発性骨髄腫 ①DVMP

インターバル日数： 42

基準日： 1

最大クール数：

使用する抗がん剤：

| 抗がん剤/用法 | 用量/単位 | Day 1 | Day 4 | Day 8 | Day 11 | Day 15 | Day 22 | Day 25 | Day 29 | Day 32 | Day 36 | Day 42 | | | |
|--|-----------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|
| ベルケイド注射用 療法名：初発多発性骨髄腫 ①DVMP 皮下注射：ワンショット 左右大腿部・腹部に投与 1mLシリンジで払い出し | 1.3m g/m ² | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| ダラザレックス点滴静注 療法名：初発多発性骨髄腫 ①DVMP 点滴静注(末梢)： *点滴速度 50ml/h：点滴時間 1200分で 投与経路：末梢ルートメイン1 | 16m g/kg | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| ダラザレックス点滴静注 療法名：初発多発性骨髄腫 ①DVMP 点滴静注(末梢)： *点滴速度 50ml/h：点滴時間 10時間で 投与経路：末梢ルートメイン1 | 16m g/kg | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| ダラザレックス点滴静注 療法名：初発多発性骨髄腫 ①DVMP 点滴静注(末梢)： *点滴速度 100ml/h：点滴時間 5.01時間 で 投与経路：末梢ルートメイン1 | 16m g/kg | | | | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | | | |
| 休業完了 | | | | | | | | | | | | 休 | | | |

メルファラン 9 mg/m² Day1-4

プレドニゾロン 60 mg/m² Day2-4