レジメン名称大腸癌 ①FOLFIRI+A(5mg/kg)

インターバル日数： 14　　基準日： 1　　最大クール数：

使用する抗がん剤:

抗癌剤/用法	用量/単位	Day 1	Day 14												
アバスチン点滴静注用 療法名:大腸癌 ①FOLFIRI+A(5mg/kg) 中心静脈注射(CVﾎﾟｰﾄ): 点滴速度 66.8ml/h ： ＊点滴時間 1.5時間で 投与経路:埋込型ｶﾃｰﾃﾙﾙｰﾄ	5ｍｇ/kg	○													
レボホリナート点滴静注用「ﾄｰﾜ」 療法名:大腸癌 ①FOLFIRI+A(5mg/kg) 中心静脈注射(CVﾎﾟｰﾄ): 点滴速度 125ml/h ： ＊点滴時間 2時間で 投与経路:埋込型ｶﾃｰﾃﾙﾙｰﾄ イリノテカンと同時投与	200ｍｇ/m2	○													
イリノテカン点滴静注液「SUN」 療法名:大腸癌 ①FOLFIRI+A(5mg/kg) 中心静脈注射(CVﾎﾟｰﾄ): 点滴速度 366ml/h ： ＊点滴時間 1.5時間で 投与経路: 側管 ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄと同時投与	150ｍｇ/m2	○													
フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」 療法名:大腸癌 ①FOLFIRI+A(5mg/kg) 中心静脈注射(CVﾎﾟｰﾄ): 点滴速度 0ml/h ： ＊点滴時間 5分で 投与経路:埋込型ｶﾃｰﾃﾙﾙｰﾄ 全開滴下	400ｍｇ/m2	○													
フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」 療法名:大腸癌 ①FOLFIRI+A(5mg/kg) インフューザー(2.5mL/hr): 点滴速度 1043ml/h ： ＊点滴時間 46時間で 投与経路:埋込型ｶﾃｰﾃﾙﾙｰﾄ 注入時間46時間 全量100ml	2400ｍｇ/m2	○													
休薬完了			休												