# レジメン名称大腸癌 mFOLFOX6

**インターバル日数：** 14　　**基準日：** 1　　**最大クール数：**

**使用する抗がん剤:**

| 抗癌剤/用法 | 用量/単位 | Day 1 | Day 14 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レボホリナート点滴静注用「ﾄｰﾜ」<br>療法名:大腸癌 mFOLFOX6<br>中心静脈注射(CVﾎﾟｰﾄ):<br>点滴速度 125ml/h ： ＊点滴時間 2時間で<br>投与経路:埋込型ｶﾃｰﾃﾙﾙｰﾄ<br>オキサリプラチンと同時投与 | 200ｍｇ/m2 | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| オキサリプラチン点滴静注「ﾄｰﾜ」<br>療法名:大腸癌 mFOLFOX6<br>中心静脈注射(CVﾎﾟｰﾄ):<br>点滴速度 550ml/h ： ＊点滴時間 2時間で<br>投与経路: 側管<br>レボホリナートと同時投与 | 85ｍｇ/m2 | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」<br>療法名:大腸癌 mFOLFOX6<br>中心静脈注射(CVﾎﾟｰﾄ):<br>点滴速度 0ml/h ： ＊点滴時間 5分で<br>投与経路:埋込型ｶﾃｰﾃﾙﾙｰﾄ<br>全開で滴下 | 400ｍｇ/m2 | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」<br>療法名:大腸癌 mFOLFOX6<br>インフューザー(2.5mL/hr):<br>点滴速度 1043ml/h ： ＊点滴時間 46時間で<br>投与経路:埋込型ｶﾃｰﾃﾙﾙｰﾄ<br>注入時間46時間<br>全量100ml | 2400ｍｇ/m2 | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 休薬完了 | | | 休 | | | | | | | | | | | | |