レジメン名称【特】食道癌 mFOLFOX6（末梢）RT併用

インターバル日数： 14　　基準日： 1　　最大クール数：

使用する抗がん剤:

抗癌剤/用法	用量/単位	Day 1	Day 14												
レボホリナート点滴静注用「ﾔｸﾙﾄ」 療法名:【特】食道癌 mFOLFOX6（末梢）RT併用 点滴静注(末梢): 点滴速度 125ml/h ： ＊点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン１ オキサリプラチンと同時投与	200ｍｇ/m2	○													
オキサリプラチン点滴静注液「NK」 療法名:【特】食道癌 mFOLFOX6（末梢）RT併用 点滴静注(末梢): 点滴速度 550ml/h ： ＊点滴時間 2時間で 投与経路: 末梢側管1a レボホリナートと同時投与	85ｍｇ/m2	○													
フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」 療法名:【特】食道癌 mFOLFOX6（末梢）RT併用 点滴静注(末梢): 点滴速度 0ml/h ： ＊点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン１ 全開で滴下	400ｍｇ/m2	○													
フルオロウラシル注「ﾄｰﾜ」 療法名:【特】食道癌 mFOLFOX6（末梢）RT併用 点滴静注(末梢): 点滴速度 717ml/h ： ＊点滴時間 46時間で 投与経路:末梢ルートメイン１	1600ｍｇ/m2	○													
休薬完了			休												