# レジメン名称【特】大腸癌 ①Ram+FOLFIRI

**インターバル日数：** 14　　**基準日：** 1　　**最大クール数：**

**使用する抗がん剤:**

| 抗癌剤/用法 | 用量/単位 | Day 1 | Day 14 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイラムザ点滴静注液<br>療法名:【特】大腸癌 ①Ram+FOLFIRI<br>中心静脈注射(CVﾎﾟｰﾄ):<br>点滴速度 250ml/h ： ＊点滴時間 1時間で<br>投与経路:埋込型ｶﾃｰﾃﾙﾙｰﾄ | 8ｍｇ/kg | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| レボホリナート点滴静注用｢ﾄｰﾜ｣<br>療法名:【特】大腸癌 ①Ram+FOLFIRI<br>中心静脈注射(CVﾎﾟｰﾄ):<br>点滴速度 125ml/h ： ＊点滴時間 2時間で<br>投与経路:埋込型ｶﾃｰﾃﾙﾙｰﾄ<br>イリノテカンと同時投与 | 200ｍｇ/m2 | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| イリノテカン点滴静注液｢SUN｣<br>療法名:【特】大腸癌 ①Ram+FOLFIRI<br>中心静脈注射(CVﾎﾟｰﾄ):<br>点滴速度 406ml/h ： ＊点滴時間 90分で<br>投与経路: 側管<br>ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄと同時投与 | 180ｍｇ/m2 | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| フルオロウラシル注｢ﾄｰﾜ｣<br>療法名:【特】大腸癌 ①Ram+FOLFIRI<br>中心静脈注射(CVﾎﾟｰﾄ):<br>点滴速度 0ml/h ： ＊点滴時間 5分で<br>投与経路:埋込型ｶﾃｰﾃﾙﾙｰﾄ<br>全開滴下 | 400ｍｇ/m2 | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| フルオロウラシル注｢ﾄｰﾜ｣<br>療法名:【特】大腸癌 ①Ram+FOLFIRI<br>インフューザー(2.5mL/hr):<br>点滴速度 1043ml/h ： ＊点滴時間 46時間で<br>投与経路:埋込型ｶﾃｰﾃﾙﾙｰﾄ<br>注入時間46時間<br>全量100ml | 2400ｍｇ/m2 | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 休薬完了 | | | 休 | | | | | | | | | | | | |