

茨城県立中央病院 手術部運営委員会 術前中止薬一覧

こちらに記載されているものは、手術や侵襲的処置を必要とする場合の基本的な術前中止期間を記載しています。
術前中止の判断は術式、侵襲度、また患者さんの状態に応じて主治医が患者さんとの間で行って下さい。

2023.4改訂

種類		一般名	商品名	茨城県立中央病院手術部推奨中止期間案
糖尿病薬	インスリン分泌促進薬	ミチグリニド	グルファスト	絶食時から休薬
		レパグリニド	シュアポスト	
		ナテグリニド	スターシス	
			ファステック	
	SU剤	グリメピリド	アマリール	
		グリベンクラミド	オイグルコン	
		グリクラジド	グリミクロン	
		グリクロピラミド	デアメリン	
		アセトヘキサミド	ジメリン	
		クロルプロパミド	クロルプロパミド	
	α-GI	アカルボース	グルコバイ	
		ミグリトール	セイブル	
		ボグリボース	ベイスン	
	TZD誘導体	ピオグリタゾン	アクトス	
	BG類	メトホルミン	メトグルコ	前々日から休薬
			グリコラン	
		ブホルミン	ジベトス	
	ミトコンドリア機能改善薬	イメグリミン	ツイミーグ	絶食時から休薬
	DPP-4阻害薬	ビルダグリプチン	エクア	絶食時から休薬
		シタグリプチン	ジャヌビア	
			グラクティブ	
		テネリグリプチン	テネリア	
		リナグリプチン	トラゼンタ	
		アログリプチン	ネシーナ	
		サキサグリプチン	オングリザ	
		アナグリプチン	スイニー	
		トレラグリプチン	ザファテック(週1回製剤)	
		オマリグリプチン	マリゼブ(週1回製剤)	
	SGLT-2阻害薬	カナグリフロジン	カナグル	3日前から休薬
		エンパグリフロジン	ジャディアンス	
		イブラグリフロジン	スーグラ	
		ダパグリフロジン	フォシーガ	
		トホグリフロジン	デベルザ	
		ルセオグリフロジン	ルセフィ	
	GLP-1(注射)	デュラグルチド	トルリシティ(週1回製剤)	絶食時から休薬
		エキセナチド	バイエッタ	
		リラグルチド	ビクトーザ	
		インスリンデグルデク/リラグルチド	ゾルトファイ	
		リキシセナチド	リクスミア	
		インスリングラルギン/リキシセナチド	ソリクア	
		セマグルチド	オゼンピック(週1回製剤)	
	GLP-1(経口)	セマグルチド	リベルサス	前々日から休薬
	BG + TZD	メトホルミン/ピオグリタゾン	メタクト	
	BG + DPP-4	メトホルミン/ビルダグリプチン	エクメット	
		メトホルミン/アログリプチン	イニシンク	
		メトホルミン/アナグリプチン	メアナ	
	SU + TZD	グリメピリド/ピオグリタゾン	ソニアス	絶食時から休薬
	DPP-4 + TZD	アログリプチン/ピオグリタゾン	リオベル	
	α-GI + インスリン分泌促進薬	ボグリボース/ミチグリニド	グルベス	3日前から休薬
	DPP-4 + SGLT-2	テネリグリプチン/カナグリフロジン	カナリア	
		シタグリプチン/イブラグリフロジン	スージャヌ	
		リナグリプチン/エンパグリフロジン	トラディアンス	