

茨城県立中央病院 手術部運営委員会 術前中止薬一覧

こちらに記載されているものは、手術や侵襲的処置を必要とする場合の基本的な術前中止期間を記載しています。
術前中止の判断は術式、侵襲度、また患者さんの状態に応じて主治医が患者さんとの間で行って下さい。

2025.4改訂

種類		一般名	商品名	茨城県立中央病院手術部推奨中止期間
女性ホルモ ン関連薬	低用量経口避妊薬	エチニルエストラジオール/レボノルゲストレル	アンジュ	4週間前から休薬
			トリキュラー	
			ラベルフィーユ	
		エチニルエストラジオール/デソゲストレル	マーベロン	
			ファボワール	
		LEP製剤	エチニルエストラジオール/ノルエチステロン	
	フリウェル			
	エチニルエストラジオール/ドロスピレノン		ルナベル	
			ヤーズ	
			ヤーズフレックス	
	ドロエチ			
	卵胞ホルモン	エチニルエストラジオール/レボノルゲストレル	ジェミーナ	
		エストラジオール	ジュリナ	
			ル・エストロジェル	
			ディビゲル	
			エストラーナ	
		エストリオール	エストリール	
			ホーリンV	
		結合型エストロゲン	ブレマリン	
	卵胞ホルモン・黄体ホルモン	エチニルエストラジオール/ノルゲストレル	プラノパール	
		エストラジオール/レボノルゲストレル	ウェールナラ	
		エストラジオール/ノルエチステロン	メノエイドコンビ	
		メストロール/ドロスピレノン	アリッサ	
	黄体ホルモン	メドロキシプロゲステロン	ヒスロン	
ヒスロンH				
プロベラ				
プロゲステロン		エフメノ		
アロマトーゼ阻害薬	アナストロゾール	アリミデックス	手術への影響を最小限にするために、患者さんの希望も考慮し、薬剤の作用を鑑みた上で中止可能な薬剤は中止することを推奨する	
	レトロゾール	フェマーラ		
抗エストロゲン薬	タモキシフェン	ノルバデックス		
	トレミフェン	フェアストン		