

茨城県立中央病院 手術部運営委員会 術前中止薬一覧

こちらに記載されているものは、手術や侵襲的処置を必要とする場合の基本的な術前中止期間を記載しています。
術前中止の判断は術式、侵襲度、また患者さんの状態に応じて主治医が患者さんとの間で行って下さい。

2025.4改訂

| 種類 | 一般名 | 商品名 | 茨城県立中央病院手術部推奨中止期間 |
|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| ACE阻害薬 | アラセブリル | セタブリル | 24時間は投与しないことが望ましい |
| | イミダブリル | タナトリル | |
| | エナラブリル | レニベース | |
| | カプトブリル | カブトリル | |
| | テモカブリル | エースコール | |
| | デラブリル | アデカット | |
| | トランドラブリル | オドリック | |
| | ペリンドブリル | コバシル | |
| | リシノブリル | ロンゲス | |
| | | | |
| ARB | アジルサルタン | アジルバ | 24時間は投与しないことが望ましい |
| | イルベサルタン | イルベタン | |
| | オルメサルタン | アバプロ | |
| | カンデサルタン | オルメテック | |
| | テルミサルタン | ブロプレス | |
| | バルサルタン | ミカルディス | |
| | ロサルタン | ディオバン | |
| ARB + 利尿薬 | ロサルタン/ヒドロクロロチアジド | ニューロタン | 24時間は投与しないことが望ましい |
| | ロサルヒド | プレミネット | |
| | コディオ | ロサルヒド | |
| | バルヒディオ | バルヒディオ | |
| | エカード | カンデサルタン/ヒドロクロロチアジド | |
| | カデチア | カデチア | |
| | ミコンビ | テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド | |
| | テルチア | テルチア | |
| | イルトラ | イルベサルタン/トリクロルメチアジド | |
| | | | |
| ARB + CCB | バルサルタン/アムロジピン | エックスフォージ | 24時間は投与しないことが望ましい |
| | アムバロ | アムバロ | |
| | アテディオ | バルサルタン/シルニジピン | |
| | レザルタス | オルメサルタン/アゼルニジピン | |
| | ユニシア | カンデサルタン/アムロジピン | |
| | カムシア | ミカムロ | |
| | テラムロ | テルミサルタン/アムロジピン | |
| | アイミクス | イルベサルタン/アムロジピン | |
| | イルアミクス | ザクラス | |
| | ジルムロ | アジルサルタン/アムロジピン | |
| ARB + 利尿薬 + CCB | テルミサルタン/アムロジピン/ヒドロクロロチアジド | ミカトリオ | |
| レニン阻害薬 | アリスキレン | ラジレス | |
| ARB/NEP阻害薬 | サクビトリルバルサルタン | エンレスト | |