

茨城県立中央病院 手術部運営委員会 術前中止薬一覧

こちらに記載されているものは、手術や侵襲的処置を必要とする場合の基本的な術前中止期間を記載しています。
術前中止の判断は術式、侵襲度、また患者さんの状態に応じて主治医が患者さんとの間で行って下さい。

2025.4改訂

種類	一般名	商品名	茨城県立中央病院手術部推奨中止期間	
抗血栓薬	抗凝固薬	アピキサバン	エリキュース 出血低リスク Ccr 30以上 24時間以上前から休薬 15-29 36時間以上前から休薬 出血高リスク Ccr 15以上 48時間以上前から休薬	
		リバーロキサバン	イグザレルト 24時間以上前から休薬	
		ダビガトラン	プラザキサ 出血低リスク Ccr 80以上 24時間以上前から休薬 50-79 36時間以上前から休薬 30-49 48時間以上前から休薬 出血高リスク Ccr 80以上 48時間以上前から休薬 50-79 72時間以上前から休薬 30-49 96時間以上前から休薬	
		エドキサバン	リクシアナ 24時間以上前から休薬	
		ワルファリン	ワーファリン 3~5日前から休薬 ただしINRの確認必要	
	抗血小板薬	サルボグレラート	アンブラーグ 24時間以上前から休薬	
		ジピリダモール	ペルサンチン 1~2日前から休薬	
		テクロピジン	パナルジン 10~14日前から休薬	
		クロピドグレル	プラビックス 14日以上前から休薬	
		プラスグレル	エフィエント 14日以上前から休薬	
		チカグレロル	ブリリント 5日以上前から休薬	
		リマプロスト	オバルモン 1日前から休薬	
		シロスタゾール	プレタール 3日前から休薬	
		アスピリン	バイアスピリン	7日前から休薬
			パファリン	
			ファモター	
			ニトギス	
			パッサミン	
		アスピリン/ランソプラゾール	タケルダ	14日前から休薬
		アスピリン/ボノブラザン	キャブピリン	
		アスピリン/クロピドグレル	コンブラビン	14日前から休薬
			ロレアス	
ベラプロスト	プロサイリン	1日前から休薬		
	ケアロードLA			
	ドルナー			
	ベラサスLA			
イコサペント酸エチル(EPA)	エバデール	7~10日前から休薬		
オメガ-3脂肪酸エチル・イコサペント酸エチル・ドコサヘキサエン酸エチル	ロトリガ			