

茨城県立中央病院 手術部運営委員会 術前中止薬一覧

こちらに記載されているものは、手術や侵襲的処置を必要とする場合の基本的な術前中止期間を記載しています。
術前中止の判断は術式、侵襲度、また患者さんの状態に応じて主治医が患者さんとの間で行って下さい。

2025.4改訂

種類	一般名	商品名	茨城県立中央病院手術部推奨中止期間
健康食品・サプリメント	レスベラトロール		薬物代謝酵素に影響を与える可能性
	イチョウ葉エキス		血小板活性化因子の抑制 24時間前から中止
	セントジョーンズワート(セイヨウオトギリソウ)		神経伝達物質の再取り込み抑制 5日間中止
	EPA/DHA		血小板凝集抑制 3～4日前から中止
	ガーリック(ニンニク)		血小板凝集抑制、線溶亢進、不明の降圧効果 7日間の中止
	朝鮮人参		血小板凝集抑制、PT-APTT延長、血糖降下 7日間の中止
	ジンジャー(生姜)		末梢循環改善、抗酸化 7日間の中止
	カバ		鎮静、抗不安 24時間中止
	エフェドラ		交感神経刺激 24時間中止
	フィーバーフュー		血小板凝集抑制、抗炎症 7日間の中止
	バレリアン		鎮静 中止に関するデータなし
	エキナケア		細胞性免疫活性の賦活 中止に関するデータなし
	ノコギリヤシ		前立腺肥大改善 中止に関するデータなし
	アロエ		便秘の改善、血小板凝集抑制
	アルファルファ		ワルファリン抗凝固作用の減弱 中止に関するデータなし
	クロレラ		
	青汁(ケール)		
	クマザサ		
	ウコン		抗凝固作用を持つ
	カモミール		
	ナットーキナーゼ		抗凝固薬との併用で出血リスク増加
	パパイヤ		
	コエンザイムQ10		抗凝固薬、血小板凝集抑制薬との併用時出血リスク増加
	パッションフラワー		
	セイヨウエビラハギ(メリロート)		クマリン誘導体を含み出血リスク増加