

レジメン名称胃癌 ①Zolbetuximab+mFOLF0X6(1日法)

インターバル日数： 14

基準日： 1

最大クール数：

使用する抗がん剤：

抗癌剤/用法	用量/単位	Day 1	Day 14												
ピロイ点滴静注用 療法名:胃癌 ①Zolbetuximab+mFOLF0X6(1日法) 中心静脈注射(CVポート): *点滴速度 65ml/h : 点滴時間 9.23時間で 投与経路:埋込型カテーテルルート	800m g /m2	○													
レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 療法名:胃癌 ①Zolbetuximab+mFOLF0X6(1日法) 中心静脈注射(CVポート): 点滴速度 125ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:埋込型カテーテルルート オキサリプラチンと同時投与	200m g /m2	○													
オキサリプラチン点滴静注液「NK」 療法名:胃癌 ①Zolbetuximab+mFOLF0X6(1日法) 中心静脈注射(CVポート): 点滴速度 550ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:側管 レボホリナートと同時投与	85m g /m2	○													
フルオロウラシル注「ト-7」 療法名:胃癌 ①Zolbetuximab+mFOLF0X6(1日法) 中心静脈注射(CVポート): 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:埋込型カテーテルルート 全開で滴下	400m g /m2	○													
フルオロウラシル注「ト-7」 療法名:胃癌 ①Zolbetuximab+mFOLF0X6(1日法) インフューザー(2.5mL/hr): 点滴速度 1043ml/h : *点滴時間 46時間で 投与経路:埋込型カテーテルルート 注入時間46時間 全量100ml	2400m g /m2	○													
休薬完了			休												

アルプラゾラム錠0.4mg1回1錠d1朝食後(予測性嘔吐予防)