レジメン名称【特】小腸癌 FOLFIRI

インターバル日数: 14 **基準日:** 1 最大クール数:

使用する抗がん剤:

IX/II 7 ODIN TONI.									
抗癌剤/用法	用量/単位	Day 1	Day 14						
レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 療法名:【特】小腸癌 FOLFIRI 中心静脈注射(CVポート): 点滴速度 125ml/h: *点滴時間 2時間で 投与経路:埋込型カテーテルルート イリノテカンと同時投与	200 m g/m2	0							
イリノテカン点滴静注液「NK」 療法名:【特】小腸癌 FOLFIRI 中心静脈注射(CVポート): 点滴速度 366ml/h: *点滴時間 1.5時間 で 投与経路: 側管 レボホリナートと同時投与	150 m g/m2	0							
フルオロウラシル注「トーワ」 療法名:【特】小腸癌 FOLFIRI 中心静脈注射(CVポート): 点滴速度 Oml/h: *点滴時間 5分で 投与経路:埋込型カテーテルルート 全開で滴下	400 m g/m2	0							
フルオロウラシル注「トーワ」 療法名:【特】小腸癌 FOLFIRI インフューザー(2.5mL/hr): 点滴速度 1043ml/h: *点滴時間 46時間 で 投与経路:埋込型カテーテルルート 注入時間46時間 全量100ml	2400m g /m2	0							
休薬完了			休						