レジメン名称胃癌 ②以降Zolbetuximab+mFOLFOX6

インターバル日数: 14

基準日: 1 最大クール数:

使用する抗がん剤:

使用9句机が心剤:									
抗癌剤/用法	用量/単位	Day 1	Day 14						
ビロイ点滴静注用 療法名:胃癌 ②以降 Zolbetuximab+mF0LF0X6 中心静脈注射(CVポート): *点滴速度 50ml/h: 点滴時間 7時間で 投与経路:埋込型カテーテルルート	400 m g/m2	0							
レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 療法名:胃癌 ②以降 Zolbetuximab+mFOLFOX6 中心静脈注射(CVポート): 点滴速度 125ml/h: *点滴時間 2時間で 投与経路:埋込型カテーテルルート オキサリプラチンと同時投与	200 m g/m2	0							
オキサリプラチン点滴静注液「NK」 療法名: 胃癌 ②以降 Zolbetuximab+mFOLFOX6 中心静脈注射(CVポート): 点滴速度 550ml/h: *点滴時間 2時間で 投与経路: 側管 レボホリナートと同時投与	85m g/m2	0							
フルオロウラシル注「トーワ」 療法名: 胃癌 ②以降 Zolbetuximab+mF0LF0X6 中心静脈注射(CVポート): 点滴速度 Oml/h: *点滴時間 5分で 投与経路:埋込型カテーテルルート 全開で滴下	400 m g/m2	0							
フルオロウラシル注「トーワ」 療法名:胃癌 ②以降 Zolbetuximab+mF0LF0X6 インフューザー(2.5mL/hr): 点滴速度 1043ml/h: *点滴時間 46時間 で 投与経路:埋込型カテーテルルート 注入時間46時間 全量100ml	2400m g /m2	0							
休薬完了			休						