レジメン名称NSCLC①Amivantamab+CBDCA+PEM (≧80kg)

インターバル日数: 21

- **基準日:** 1 最大クール数:

使用するはがく刻。

使用する抗がん剤:											
抗癌剤/用法	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 8	Day 15	Day 21					
ペメトレキセド点滴静注液「NK」 療法名:NSCLC①Amivantamab+CBDCA+PEM (≧80kg) 点滴静注(末梢): 点滴速度 0ml/h: *点滴時間 10分で 投与経路:末梢ルートメイン1	500 m g/m2	0									
カルボプラチン注射液「日医工」 療法名:NSCLC①Amivantamab+CBDCA+PEM(≧80kg) 点滴静注(末梢): 点滴速度 255ml/h: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	5 (AUC)	0									
ライブリバント点滴静注 療法名:NSCLC①Amivantamab+CBDCA+PEM(≥80kg) 点滴静注(末梢): *点滴速度 50ml/h: 点滴時間 4.86時間 で 投与経路:末梢ルートメイン1 生食7ml抜く(薬剤科実施)	350m g	0									
ライブリバント点滴静注 療法名:NSCLC①Amivantamab+CBDCA+PEM (≧80kg) 点滴静注(末梢): *点滴速度 25m1/h: 点滴時間 8.88時間 で 投与経路:末梢ルートメイン 1 生食28m1抜く (薬剤科実施)	1400m g		0								
ライブリバント点滴静注 療法名:NSCLC①Amivantamab+CBDCA+PEM (≧80kg) 点滴静注(末梢): *点滴速度 65m1/h: 点滴時間 3.31時間 で 投与経路:末梢ルートメイン1 生食35m1抜く (薬剤科実施)	1750m g			0							
ライブリバント点滴静注 療法名:NSCLC①Amivantamab+CBDCA+PEM (≧80kg) 点滴静注(末梢): *点滴速度 85m1/h: 点滴時間 2.53時間 で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1750m g				0						

レジメン名称NSCLC①Amivantamab+CBDCA+PEM (≧80kg)

インターバル日数: 21 **基準日**: 1 **最**大クール数: