

レジメン名称胃癌 ①Zolbetuximab+mFOLFOX6(2日法)

インターバル日数： 14

基準日： 1

最大クール数：

使用する抗がん剤：

抗癌剤/用法	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 14											
ビロイ点滴静注用 療法名：胃癌 ①Zolbetuximab+mFOLFOX6(2日法) 中心静脈注射(CVポ-ト)： *点滴速度 65ml/h：点滴時間 9.23時間で 投与経路：埋込型カテーテルルート	800m g /m2	○													
レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 療法名：胃癌 ①Zolbetuximab+mFOLFOX6(2日法) 中心静脈注射(CVポ-ト)： 点滴速度 125ml/h：*点滴時間 2時間で 投与経路：埋込型カテーテルルート オキサリプラチンと同時投与	200m g /m2		○												
オキサリプラチン点滴静注液「NK」 療法名：胃癌 ①Zolbetuximab+mFOLFOX6(2日法) 中心静脈注射(CVポ-ト)： 点滴速度 550ml/h：*点滴時間 2時間で 投与経路：側管 レボホリナートと同時投与	85m g /m2		○												
フルオロウラシル注「ト-ワ」 療法名：胃癌 ①Zolbetuximab+mFOLFOX6(2日法) 中心静脈注射(CVポ-ト)： 点滴速度 0ml/h：*点滴時間 5分で 投与経路：埋込型カテーテルルート 全開で滴下	400m g /m2		○												
フルオロウラシル注「ト-ワ」 療法名：胃癌 ①Zolbetuximab+mFOLFOX6(2日法) インフューザー(2.5mL/hr)： 点滴速度 1043ml/h：*点滴時間 46時間で 投与経路：埋込型カテーテルルート 注入時間46時間 全量100ml	2400m g /m2		○												
休薬完了				休											

アルプラゾラム錠0.4mg1回1錠d1朝食後(予測性嘔吐予防)